



องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อไวรัสซิกา

โดนยุงกัด เสี่ยงป่วยไข้ซิกา



ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค

การติดต่อ

- จากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้
- มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยติดเชื้อ

อาการ

ภาวะแทรกซ้อน

ทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ

มีศีรษะเล็ก
การได้ยินผิดปกติ
พัฒนาการช้า



มีไข้
อ่อนเพลีย
ปวดข้อ



ปวดศีรษะ ตาแดง
ผื่นแดงตามลำตัว
แขนขา



ถ้ามีอาการข้างต้นให้รีบไปหาหมอ

การป้องกัน



เก็บบ้าน/โรงเรียน ให้สะอาด



เก็บขยะ บริเวณบ้าน/
โรงเรียนให้เรียบร้อย



เก็บภาชนะให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่



ทายากันยุง นอนในมุ้ง
หรือห้องที่มีมุ้งลวดกันยุง